

4 questions pour évaluer le contrôle de l'asthme chez nos patients

Epidémiologie

- 10 % des enfants
- 7 % des adultes
- 54 130 hospitalisations/an
- Absentéisme : 4 à 28 %
- Prise en charge en MG

De la sévérité au contrôle

- Sévérité : fonction du nombre de traitements nécessaires
- Contrôle : manifestations de l'asthme chez le patient
- Le contrôle diminue le nombre d'exacerbations

Problème

5 à 8 patients asthmatiques sur 10
sont mal contrôlés

Nouvelle recommandation (GINA)

Dans les 4 dernières semaines, le patient a-t-il eu :

> 2 symptômes diurnes/semaine

Un réveil nocturne à cause de l'asthme

Un besoin de traitement d'appoint > 2 fois/semaine

Une limitation de l'activité due à l'asthme

Nouvelle recommandation (GINA)

Dans les 4 dernières semaines, le patient a t'il eu :	Bien contrôlé	Partiellement contrôlé	Non contrôlé
> 2 symptômes diurnes/semaine	Aucun	1 ou 2	3 ou 4
Un réveil nocturne à cause de l'asthme			
Un besoin de traitement d'appoint > 2 fois/semaine			
Une limitation de l'activité due à l'asthme			

Conclusion

- Un meilleur contrôle c'est une meilleure qualité de vie pour nos patients
- 4 questions rapides pour s'assurer du contrôle

Dans les 4 dernières semaines, le patient a-t-il eu :

> 2 symptômes diurnes/semaine

Un réveil nocturne à cause de l'asthme

Un besoin de traitement d'appoint > 2 fois/semaine

Une limitation de l'activité due à l'asthme

Merci de votre attention